

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**  
**UFFICIO SERVIZI FITOSANITARI IN COLLABORAZIONE CON I.A.R.**

<b>TRATTAMENTI BIOLOGICI SUL MELO 2006</b>				
<b>REG. (CE) 2092/91</b>				
<b>STADIO FENOLOGICO</b>	<b>MALATTIA</b>	<b>PRINCIPI ATTIVI</b>	<b>DOSE g.cc/hl</b>	<b>NOTE</b>
Punte verdi	-CANCRI e MALATTIE FUNG.	RAME	Vedi etichetta	10÷20 g/hl di rame metallo. Nel bio sono autorizzati al max 8 kg di rame/ha/anno o 38 kg/Cu/ha in 5 anni.
	-COCCINIGLIE ACARI	OLIO DI PARAFFINA OLIO VEGETALE	2.000 3.000	Azione contro acari, afidi e altri insetti. Aggiungere 1 kg/hl di sapone
	- COCCINIGLIE MALATTIE FUNG.	POLISOLFURO di Ca	18.000	Il polisolfuro non è miscibile con altri prodotti. Distanziare di 15÷20 gg l'uso del polisolfuro da olio e rame.
Pre-fioritura	-OIDIO	ZOLFO BAGNABILE AMPELOMICES quisqualis	300 70	Dose per ettaro
	-TICCHIOLATURA	RAME POLISOLFURO di Ca	Vedi stadio punte verdi 2.000	Agisce anche contro l'oidio e le cocciniglie
	-COCCINIGLIE	OLIO OLIO VEGETALE	2.500 3.000	Azione contro acari, afidi e altri insetti. Aggiungere 1 kg/hl di sapone
	-AFIDI	AZADIRACTINA PIRETRO NATURALE	150 80	
Fioritura		Nessun trattamento salvo autorizzazione		
	- TICCHIOLATURA	POLISOLFURO di Ca ZOLFO BAGNABILE	1.500 400-500	Azione diradante Solo o in miscela con terra argillosa acida 1kg/hl (Ulmasud-Rocksil)
Caduta petali	-TICCHIOLATURA	RAME PROTEINATO DI ZOLFO POLISOLFURO di Ca ZOLFO BAGNABILE	etichetta 700 1.200 300	5÷10 g/hl di rame metallo. Usare da fine fioritura e nelle 8 settimane seguenti. Può causare arrossamenti.
	-OIDIO	ZOLFO IN POLVERE (Kg/ha.) ZOLFO BAGNABILE AMPELOMICES quisqualis	20-25 200-300 70	Il polisolfuro è da usare su foglie ancora bagnate. Dose per ettaro
	-AFIDI	AZADIRACTINA PIRETRO NATURALE + OLIO ESTIVO SALI DI POTASSIO	150 80 1500 1.500	Da ripetere dopo 7-10 gg Intervenire solamente in presenza del parassita.
	-RICAMATORI	BACILLUS thuringiensis	100-150	Aggiungere 500 g/hl di zucchero.
Piccoli frutti	-TICCHIOLATURA -OIDIO -AFIDI	Vedi stadio caduta petali Vedi stadio caduta petali Vedi stadio caduta petali		Lo zolfo, con temperature elevate può causare delle bruciature.
	-CARPOCAPSA (I° generazione)	CONFUSIONE SESSUALE VIRUS DELLA GRANULOSI+ RESINA DI PINO (pinolene)	10 300	Grandes surfaces Aggiungere 500 g/hl di zucchero.
Giugno	-TICCHIOLATURA -OIDIUO -AFIDI	Vedi stadio caduta petali Vedi stadio caduta petali Vedi stadio caduta petali		Ticchio.: in presenza di infezioni primarie, ad ogni pioggia si deve intervenire x evitare la secondaria. Oidio: mantenere protetta la vegetazione
Luglio-Agosto	-CARPOCAPSA (II° generazione)	CONFUSIONE SESSUALE VIRUS DELLA GRANULOSI+ RESINA DI PINO (pinolene)	10 300	Valido su grandi superfici. Aggiungere 500 g/hl di zucchero.
	-AFIDI	Vedi stadio caduta petali		Solo in caso di attacchi ripetuti
	-RICAMATORI	B.thuringiensis	100-150	Da ripetere dopo 7-10 gg
	-TICCHIOLATURA -OIDIO	Vedi stadio caduta petali Vedi stadio caduta petali		Solo con infezioni primarie Mantenere protetta la vegetazione
Preraccolta	-MALATTIE di CONSERVAZIONE	RAME RESINA DI PINO (pinolene) POLISOLFURO di Ca	etichetta 300 1.500	Può causare l'arrossamento lenticellare sulle Golden. Evitare l'uso di rame colorato.
Postraccolta	-MALATTIE FUNG.	RAME	etichetta	10÷20 g/hl di rame metallo prima della caduta delle foglie nei frutteti particolarmente colpiti.

PRINCIPI ATTIVI	NOMI COMMERCIALI
AMPELOMICES QUIS.	AQ 10 wg, ecc.
AZADIRACTINA A	Azactiva, Neemazal-t/s, ecc.
BACILLUS THURING.	Lepinox, Rapax, ecc.
RAME	Airone, Ossiclor 20, Pasta caffaro nc, Poltiglia disperss, ecc.
OLIO	Albene, Biancolio E, Oliocin, ecc.
RESINA PINO (pinolene)	Vapor gard, ecc.
POLISOLFURO di Ca	Calcium, Policalcio 30, ecc.
PROTEINATO di ZOLFO	Sulfar
PIRETRO NATURALE	Biopiren plus, Florapir, Piretro natura, Piretro verde, ecc.
SALI DI POTASSIO	Ciopper, Flipper, ecc.
ZOLFO	Efeston, Tiovit jet, Microthiol disperss, Thiamonn plus, ecc.
VIRUS GRANULOSI	Carpovirusine, Madex, ecc.

**NOTE: Questo documento non deve essere considerato come un calendario per i trattamenti.**

Controlli periodici sono indispensabili per valutare l'opportunità dell'intervento consigliato.

**All'acquisto del prodotto controllare sempre che sia registrato contro la coltura e l'avversità desiderata.**

**Dosi e tempo di carenza possono variare anche tra prodotti con lo stesso principio attivo.**

Per informazioni, rivolgersi ad uno degli uffici seguenti:

- Ufficio Servizi Fitosanitari

Tel: 0165/275420

- Pont-St-Martin Tel: 0125/807757

- Morgex

Tel: 0165/800430

- Aymavilles Tel: 0165/902820

- Signayes

Tel: 0165/32338

- Arnad Tel: 0125/966438

- Châtillon

Tel: 0166/62889

- Quart Tel: 0165/765594